## AVERTISSEMENTS AGRICOLES DLP 23-6-69 945798

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE: 36 nominar per las

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17

CORF-DOR - DOUBS - HARTE-SAONE - JURA - SAONE-ET-LOIRE - TERRITORIE DE BELFORT - YONNE - NIÉSRE

Regi seur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DOON 300532 K

25 F.

Supplément nº 2 au Bulletin nº 105 - JUIN 1969

20 JUIN 1969

## VIGHE

HILDIOU: Les pluies fréquentes et abondantes (17 et 19 Juin) ont lessivé le 4ème traitement, quand celui-ci a pu être effectué.

Depuis le 19, la présence de taches fleuries et de vot gris sur grappes, la période extrêmement critique de la floraison, pendant laquelle les jeunes grappes se trouvent à un stade très sensible, imposent le ronouvellement du traitement. De toute façon, en COTE d'CR, l'opération par hélicoptère doit être complétée dès que possible par un traitement sur grappes, par atomismur à des cu par poudrage.

L'utilisation de produits organiques (sans cuivre) est recommandee pendant la période de floraison. Auguenter les doses à l'hectare de 50 %.

M.B. - Renouvelor le traitement ou cas où des précipitations importantes ou orageuses surviendraient.

## ARBRES FAULTIERS

POU DE SAN JOSE: TRAITEMENT D'UTE OBLIGATOINE: Les promières larves mobiles sortent actuellement. En conséquence, un traitement devra être obligatoirement appliqué aussi bien en sone contaminée qu'en zone de protection, en vertu de l'arrêté ministériel du 29 Hai 1946 (J.O. du 4 Juin 1948) qui prévoit que ces traitements seront effectués sous contrôle du Service de la Protection des Végétaux.

La période favorable s'étend de la réception de cet avis à fin Juin. Les produits à utiliser sont :

- soit une bouillie insecticide à base d'Oléoparathien, à raison de 1 litre de produit pour 100 litres d'eau ;
- soit une bouillie insecticide composée d'huile blanche de pétrole (1 litre pour 100 litres d'eau) addivionnée de D.L.T. 50 %, à mason de 0 Kg,200 pour 100 litres d'eau).

Dans les régions productions de cassis et de grandilles, ce traitement devra être appliqué au plus tôt de manière à respecter le déloi de 15 jours entre le traitement et la queillotte.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargis des Avertissements Agricoles.

L'Ingénieur en Chef d'Agrenemie - Inspecteur de la Protection des Végétaux - Circonscription phytosamitaire "BOUNGOGNE & FRANCHE-CONTE":

H. SOULIE.

Imprimerie de la Station "Sourgogne et Franche-Comté" Le Directeur-Gérant : L. ROUYM.

P.270